

PELICAN studie – RFA pancreas

Oncologie poli



Inductie chemotherapie (voor randomisatie)

- 4 kuren FOLFIRINOX of 2 kuren gemcitabine
- **CT-pancreas met arteriële fase** + CT-thorax <2 weken na laatste kuur
Nb: indien patiënt chemotherapie elders ontvangt dan hierom vragen in de brief. Met name arteriële fase duidelijk vermelden en verzoeken deze scan pre- en post inductie naar MDO te sturen ter bespreking.
- Indien door eigen MDO geschikt geacht voor PELICAN → expert panel

Chemotherapie na randomisatie

- 8 kuren FOLFIRINOX of 4 kuren gemcitabine
- Poli controles 1, 3, 6, 12 en 18 maanden **na start 1^{ste} studiehandeling**
- Studiehandelingen volgens protocol:

	Inductie chemo	Gemcitabine	FOLFIRINOX	FU ¹
CT-scan ²		2 maandelijks	2 maandelijks	Op indicatie
Medische geschiedenis				X
Lichamelijk onderzoek	X			X
WHO status	X	4 wekelijks	2 wekelijks	X
Hematologie lab ³	X	Wekelijks	2 wekelijks	X
Chemisch lab ⁴	X	4 wekelijks	2 wekelijks	X
VAS pijnscore	X	4 wekelijks	2 wekelijks	X
CA 19.9 & CEA				X
Adverse events	X	X	X	X

1) 1,3,6,12&18 maanden **na start van de studie behandeling** of vaker indien nodig; 2) CT-pancreas met arteriële fase;

3) Hb, L, neutro's, trombo's; 4) kalium, natrium, ureum, creatinine, CRP, albumine, amylase, lipase, ASAT, ALAT, bilirubine

SAE's melden <24 uur bij IKNL 088 23 46 500

Studiecoördinator:

088 755 86 76 / 06 83 90 42 42 / pelican@dpcg.nl