

ADVIES BILIAIRE DRAINAGE (METALEN STENT) BIJ PANCREASCARCINOOM

INDICATIES DRAINAGE: ALGEMEEN

- Advies: altijd metalen stent, tenzij:
- Metalen stent onmogelijk, dan plastic stent alternatief
- Drainage extrahepatische biliaire obstructie zonder pathologische bevestiging mogelijk met:
 - Fully covered metalen stent
 - Plastic stent

ADVIES TYPE STENT PER PATIËNTGROEP

- Resectabele tumor: Covered metalen stent
- Neoadjuvante chemotherapie: Covered metalen stent
- Locally advanced pancreatic cancer: Covered metalen stent (i.v.m. verwijderbaarheid, zoals nodig is bij eventuele RFA of nanoknife behandeling)
- Gemetastaseerde ziekte: Metalen stent (uncovered metalen stent of covered metalen stent)

INDICATIES DRAINAGE BIJ RESECTABELE TUMOREN

- Bilirubine < 250 µmol/L en wachttijd voor chirurgie > 3 weken (early surgery heeft voorkeur)
- Bilirubine > 250 µmol/L
- Cholangitis
- Jeukklachten o.b.v. icterus
- Voor start neoadjuvante behandeling indien bilirubine > 25 µmol/L

INDICATIES DRAINAGE BIJ IRRESECTABELE TUMOREN

- Cholangitis
- Jeukklachten o.b.v. icterus
- Voor start palliatieve chemotherapie indien bilirubine > 25 µmol/L
- Indien indicatie voor electieve vervanging plastic stent