



PREOPANC-4 LAPC

Nieuwe patiënt met diagnose LAPC (DPCG-criteria)

Stadiëring: CT pancreas protocol + tumormarkers CA19.9 & CEA
Indien CA19.9 <37 U/ml, overweeg ¹⁸F-FDG PET abdomen met low-dose CT (EARL)

Informed consent **LAPC-registratie** (z.o.z.) + **PACAP** + **PACAP PROMs**

Inductiechemotherapie

8 kuren (modified) FOLFIRINOX danwel 4 kuren gemcitabine-nab-paclitaxel

Herstadiëring (z.o.z.)

CT pancreas protocol + tumormarkers CA19.9 & CEA
Herhaal ¹⁸F-FDG PET abdomen met low-dose CT (EARL) indien van toepassing

Indien **RECIST niet-progressief**, teken
informed consent **PREOPANC-4** (z.o.z.)

Bespreken (eventueel) in
LAPC-expertpanel (z.o.z.)

**Na 8 kuren (m)FOLFIRINOX danwel 4 kuren gemcitabine-nab-paclitaxel
inductiechemotherapie:**

- 1) **Anatomie:** RECIST niet-progressief & mogelijk resectabel = **LAPC type 1** (pm LAPC-2)
(AMS-resectie valt buiten PREOPANC-4 = LAPC-3)
- 2) **Biologie:** CA19.9 ≥30% reductie (danwel ¹⁸F-FDG PET response bij CA19.9 <37 U/ml)
- 3) **Conditie:** Fit voor eventuele resectie

3x JA

**Overweeg exploratie met intentie voor
resectie**

> **Chirurg belt/mailt studievoördinator** (z.o.z.)
voor **eCRF-uitnodiging + case ID**

> Start met **diagnostische laparoscopie** en
overweeg **intraoperatieve echografie** t.b.v.
vaatbetrokkenheid

> **Chirurg vult eCRF in op de operatiekamer**

Resectie

NEE

**Continueren chemotherapie ±
SBRT**

NEE

Adjuvant chemotherapie
tot een totaal van 12 kuren
(m)FOLFIRINOX of 6 kuren
gemcitabine-nab-paclitaxel

JA



Criteria PREOPANC-4

Inclusiecriteria:

- 1) Leeftijd 18 jaar of ouder;
- 2) Pre-chemotherapie PA-bewezen lokaal gevorderd pancreascarcinoom (LAPC) (DPCG-criteria);
- 3) RECIST niet-progressieve ziekte (op CT-scan) na 4 maanden chemotherapie (m)FOLFIRINOX danwel gemcitabine-nab-paclitaxel.

Exclusiecriteria:

- 1) Gemetastaseerd / RECIST progressief LAPC.

Tussentijdse herstadiëring tijdens inductietherapie

Is er bij de tussentijdse evaluatie na 4 kuren (m)FOLFIRINOX danwel 2 kuren gemcitabine-nab-paclitaxel sprake van anatomische, biologische en/of conditionele verslechtering?

- > **JA**, overweeg switch naar 2 kuren gemcitabine-nab-paclitaxel danwel 4 kuren (m)FOLFIRINOX, waarna opnieuw herstadiëren.
- > **NEE**, continueren van huidig chemotherapeuticum t/m 4 maanden, waarna opnieuw herstadiëren.

LAPC-classificatie - type 1-2-3

Zie www.pancreascalculator.com voor anatomische LAPC-classificatie.

Inclusie & contactpersonen

Bel / mail **Thomas Stoop**
(**studiecoördinator**) voor:

- > Inclusie **PREOPANC-4**
- > Aanvraag **Castor eCRF + case ID**
- > Uw overige vragen

06 547 555 11

t.f.stoop@amsterdamUMC.nl

Mail **Leonard Seelen** voor:

- > Inclusie **LAPC-registratie**
- > Patiëntaanmelding **LAPC Expertpanel**

06 485 442 07

l.w.f.seelen@umcutrecht.nl